

TYTTÖJEN JUTTU

MITEN HOIDAN HPV-ROKOTUKSEN TAVANOMAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA?

HPV-rokotuksen jälkeen käsi-
varsi voi olla kipeä, ja rokotus-
alueella saattaa esiintyä punoi-
tusta, kuumotusta, turvotusta
ja kutinaa. Kutina ja ihottuma
eivät yleensä johdu rokoteaine-
allergiasta.

Muita odotettavissa olevia
haittavaikutuksia ovat kuume,
särky ja imusolmukkeiden
suureneminen.

Haittavaikutuksia tulee vain
osalle rokotetuista. Suurin osa
haittavaikutuksista on lieviä, ja
ne menevät ohi muutamassa
päivässä tai viikossa. Ne eivät
estä rokotusten jatkamista.

Rokotusraajan punoitus, turvotus, kuumotus, kutina ja kipu sekä kuume tai särky

- Ota kuume- tai
tulehduskipulääkettä:
ibuprofeenia, naprokseenia
tai parasetamolia.
- Lievitä olkavarren oireita
viileillä kääreillä.
- Pidä olkavartta levossa.
- Vältä lihasten kuormittamista
ja raskasta urheilua.
- Lievitä kutinaa
antihistamiinilla.

HPV-rokotuksen aiheuttamia ohimeneviä oireita



Lähes kaikki
kokevat kipua
rokotusalueella



Joka toisella
ilmenee punoitusta
tai turvotusta
rokotetussa
käsivarressa



Joka viides
kokee nivelsärkyä



Joka toisella
ilmenee lihassärkyä




Joka toisella
ilmenee päänsärkyä
tai väsymystä



Joka kahdeksannelle
tulee kuumetta tai
lämpöilyä



Joka neljännelle
tulee jonkinlaisia ruuan-
sulatuskanavan oireita,
kuten huonovointisuutta



Ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan tai lääkäriin, jos sinulle tulee
muita kuin yllä mainittuja oireita tai jos oireesi ovat hyvin voimakkaita.

